

Co je přípravek Nyxoid®?

Přípravek Nyxoid® je jednodávkový nosní sprej k urgentní léčbě předávkování opioidy (jako jsou heroin, methadon, fentanyl, oxykodon, buprenorfin a morfin). Každá krabička obsahuje dva nosní spreje (dvě jednotlivé dávky).

Přípravek Nyxoid® nenahrazuje akutní lékařskou péči.

Přípravek Nyxoid® by měl vždy s sebou nosit každý, kdo je vystaven riziku předávkování opioidy. Pečovatelé, jako jsou blízcí příbuzní nebo přátelé, by pro případ nouze měli vědět, kde se přípravek Nyxoid® nachází.

Kdy použít přípravek Nyxoid®

Pokud víte nebo máte podezření, že došlo k předávkování opioidy, podejte postižené osobě přípravek Nyxoid® podle návodu uvedeném na zadní straně tohoto letáku.

! VŽDY okamžitě volejte záchranou službu, a to i když se pacient probudí – může znovu upadnout do bezvědomí a přestat dýchat.


! Dbejte opatrnosti: u osoby, které byl podán Nyxoid®, se mohou objevit akutní abstinenční příznaky, které mohou být nebezpečné.

Pokud u sebe nosíte Nyxoid®...

Nastavte si v kalendáři upozornění jeden měsíc před vypršením doby použitelnosti přípravku Nyxoid®. Poté si zařídte výměnu za nový.

Jak přípravek Nyxoid® funguje?

Přípravek Nyxoid® obsahuje **naloxon**, který dočasně ruší účinky opioidů. Naloxon působí tak, že vytěsňuje molekuly opioidů z receptorů v mozku a těle.



Stručné pokyny

Podrobný návod naleznete na zadní straně tohoto letáku.

1 Zkontrolujte známky předávkování

2 Zavolejte zdravotnickou záchranou službu



3 Podejte přípravek Nyxoid®



4 Uložte do stabilizované polohy



5 Sledujte a poskytněte péči dokud nepřijede záchraná služba

6 Podejte druhou dávku přípravku Nyxoid® pokud po 2-3 minutách nepozorujete žádné zlepšení stavu pacienta nebo objeví-li se znovu příznaky předávkování



7 Dbejte na svoji bezpečnost: dávejte pozor na výskyt akutních abstinenčních příznaků

8 Zlikvidujte použitý sprej Nyxoid® a zajistěte si nový

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: <http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek>. Adresa pro zaslání: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odbor farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, email: farmakovigilance@sukl.cz.

Nyxoid® je registrovaná ochranná známka společnosti Mundipharma Corporation Limited.

www.mundipharma.com
Mundipharma GesmbH., Karolinská 654/2
186 00 Praha 8 - Karlín

Datum přípravy: květen 2024

Pracovní kód: SciA-NYX-2400043



NYXOID®
naloxon



V tomto letáku se dozvíte:

- jak rozpoznat známky předávkování opioidy
- co dělat
- jak podat přípravek Nyxoid®
- jak rozpoznat akutní abstinenční příznaky

Více informací naleznete na stránkách

www.nyxoid.com
nebo naskenujte kód QR

Stručný návod k použití
naleznete také na zadní straně obalu přípravku Nyxoid®.




1 Zkontrolujte známky předávkování

- Opatrně přistupte.** Zjistěte, zda nehrozí nebezpečí, jako jsou např. předměty pro injekční aplikaci, které by semohly nacházet v okolí.
- Zkontrolujte reakce osoby** ke zjištění, zda je při vědomí. Můžete:
 - zavolat její jméno
 - jemně jí zatřást rameny
 - hlasitěji mluvit do ucha
 - třít její hrudní kost (sternum)
 - štípnout ji do ucha nebo nehtového lůžka
- Zkontrolujte dýchací cesty a dýchání**
 - odstraňte případné překážky** v ústech a nosu
 - po dobu 10 sekund **kontrolujte dýchání** – pohybuje se hrudník? Slyšíte dýchání? Cítíte dech na tváři?
- Zkontrolujte známky předávkování**, například:
 - neodpovídá na dotek nebo zvuky
 - pomalé, nerovnoměrné dýchání nebo zástava dechu
 - chrápání, těžké dýchání nebo lapání po dechu
 - modré či nafialovělé nehty nebo rty

2 Zavolejte zdravotnickou záchrannou službu

Vždy okamžitě volejte záchrannou službu, a to i když se pacient probudí.



! Přípravek Nyxoid® nenahrazuje akutní lékařskou péči ani základní oživovací opatření (jako je kardiopulmonální resuscitace).

- Je-li to možné, nastavte telefon do režimu hlasitý odposlech, čímž se vám uvolní ruce.
- Sdělte záchranné službě co nejvíce informací**, včetně toho:
 - kde se přesně nacházíte; dobré je znát ulici a číslo domu
 - jaké látky podle vás postižená osoba mohla požit
 - zda je postižená osoba při vědomí a dýchá
 - že máte v úmyslu podat nosní sprej Nyxoid®

3 Podejte jednu dávku přípravku Nyxoid®


Jeden sprej obsahuje pouze jednu dávku.



Odlopněte zadní stranu balení přípravku Nyxoid®. Vyjměte nosní sprej a položte jej tak, abyste na něj snadno dosáhl(a).




Položte pacienta na záda. Podepřete pacientovu šíji zezadu, abyste umožnil(a) záklon pacientovy hlavy. Odstraňte viditelné překážky, které blokují nos.



Držte nosní sprej tak, jak je uvedeno na obrázku – palcem na spodní straně pístu s ukazováčkem a prostředníčkem po obou stranách trysky.

! Před použitím neprovádějte prostrknutí nosního spreje Nyxoid ani jej nezkoušejte.



Opatrně vsuňte trysku spreje do jedné nosní dírký. Podejte dávku pevným zatlačením na píst spreje, až uslyšíte cvaknutí. Vytáhněte trysku spreje z nosní dírký. Je-li to možné, poznamenejte, kterou nosní dírký jste použil(a).

4 Uložte pacienta do stabilizované polohy



Horní končetinu, která je k vám blíže, položte tak, aby svírala pravý úhel s tělem a paže byla ohnutá.



Druhou horní končetinu položte přes hrudník postiženého. Hřbet ruky postiženého mu položte na tvář.



Podložte postiženému hlavu tak, že mu ponecháte tvář položenou na hřbetu ruky.



Konečná poloha: Ruka podpirá hlavu. Horní noha je ohnutá v kyčli a kolenu.

5 Sledujte pacienta, dokud se nedostaví pomoc

- Zůstaňte s pacientem.** Pozorujte, zda se zlepšuje pacientovo dýchání a reakce na zvuky a dotyk.
- Je-li pacient v bezvědomí a nedýchá normálně, poskytněte základní oživovací péči (jako je kardiopulmonální resuscitace), máte-li příslušné proškolení*.
- Buďte pozorný (pozorná) – i pokud se pacient probere, může znovu upadnout do bezvědomí a přestat dýchat.

6 Nedošlo k zlepšení? Podejte druhou dávku

- Pokud **po 2–3 minutách** nepozorujete žádné zlepšení stavu pacienta nebo objeví-li se znovu příznaky předávkování: **podejte nový nosní sprej Nyxoid do druhé nosní dírký.** To lze provést, zatímco je pacient ve stabilizované poloze.

7 Dbejte na vlastní bezpečnost

- Přípravek Nyxoid může vyvolat **akutní abstinenční příznaky**, pokud je pacient závislý na opioidech. K příznakům může patřit:
 - bolest těla a křeče
 - pocit na zvracení, zvracení, průjem
 - horečka, výtok z nosu nebo kýchání
 - pocení, třes nebo chvění
 - nervozita nebo podrážděnost

U některých pacientů může po probrání dojít k násilnému chování.

! Dbejte na vlastní bezpečnost.

8 Po příjezdu záchranné služby

- Okamžitě oznamte posádce, co se stalo a že jste podal(a) přípravek Nyxoid.** Předajte posádce všechny použité nosní spreje Nyxoid.

Likvidace použitých nosních sprejů

Pokud zapomenete předat použité nosní spreje posádce záchranné služby, dejte je kvalifikovanému zdravotnímu pracovníkovi nebo lékárníkovi a zařídte jejich výměnu za nové. **Nikdy** nevyhazujte spreje do odpadních vod nebo domácího odpadu.

* Více informací o školeních v základní neodkladné resuscitaci naleznete na stránkách České resuscitační rady <https://www.resuscitace.cz/>